

याआठवड्यातील हवामानअंदाज
गुरुवार (24/08/2023) - बुधवार (30/08/2023)

खरड छाटणी :- १५ एप्रिल २०२३

ठिकाण	तापमान (°C)	पावसाची शक्यता		ढग आच्छादित	वाऱ्याचा वेग (किमी/तास) किमान-कमाल	सापेक्ष आर्द्रता	
	किमान	कमाल				किमान	कमाल
नाशिक	22 -23	29-30	नाशिक, दिंडोरी, ओझर, पालखेड, पिंपळगाव बसवंत, कळवण, वणी-गुरु- बुध - रिमझिम पाऊस लोणी -गुरु- मंगळ - रिमझिम	स्वच्छ ते ढगाळ	20-25	70-81	92-97
पुणे	20-21	27-28	पुणे, फुरसुंगी, लोणी काळभोर, उरुळी कांचन, पाटस, यवत, नारायणगाव, बारामती- गुरु- सोम- रिमझिम इंदापूर - गुरु-बुध - रिमझिम पाऊस	स्वच्छ ते ढगाळ	21-22	57-61	84-86
सोलापूर	22-23	33-35	सोलापूर, तुळजापूर -गुरु-मंगळ - रिमझिम पाऊस लातूर, औसा -गुरु, शुक्र, शनि, सोम, बुध-रिमझिम. नात्रज- गुरु, शुक्र, शनि, रवि, बुध- रिमझिम. पंढरपूर- गुरु- रवि- रिमझिम पाऊस	स्वच्छ ते ढगाळ	20-26	37-42	63-71

			वैराग, बार्षी-गुरु-सोम-रिमझिम पाऊस				
सांगली	21-22	30-32	शेटफळ, पळशी, वाळवा, पलूस, कवठे, खानापूर विटा - गुरु-सोम-रिमझिम पाऊस. शिरगुप्पी- गुरु, शुक्र, रवि, सोम, बुध-रिमझिम. मिरज- गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, बुध-रिमझिम.	स्वच्छ ते ढगाळ	21-22	55-59	87-94
विजयपुरा	21-22	33-35	विजयपुरा, चडचन, तिकोटा आणि तेलसंग - गुरु, शुक्र, शनि, लग्न- रिमझिम.	स्वच्छ ते ढगाळ	24-30	40-44	74-80
हैदराबाद	23-24	28-31	हैदराबाद, मेडचल--गुरु-मंगळ-रिमझिम जहिराबाद - गुरु-बुध - रिमझिम पाऊस.	स्वच्छ ते ढगाळ	12-15	46-57	67-75
सातारा	20-21	27-28	सातारा, खटाव- गुरु-मंगळ-रिमझिम पाऊस. फलटण - गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, बुध - रिमझिम पाऊस.	स्वच्छ ते ढगाळ	15-17	57-64	90-94
अहमदनगर	20-22	30-31	अहमदनगर, श्रीगोंदा- गुरु- बुध-रिमझिम पाऊस	स्वच्छ ते ढगाळ	24-29	49-55	79-83

			राहाता, कोपरगाव, संगमनेर, अकोले- गुरु, शुक्र, शनि-रिमझिम. जामखेड- गुरु-सोम-रिमझिम पाऊस कर्जत- गुरु- बुध- रिमझिम ते हलका पाऊस.				
जालना	20-21	29-30	अंबड, जालना, गानसावंगी, जाफ्राबाद - गुरु- बुध - रिमझिम	स्वच्छ ते ढगाळ	18-19	50-54	80-84
बुलढाणा	21-22	28-31	सिंदखेडराजा, दि.राजा, चिखली -गुरु- बुध - रिमझिम पाऊस बुलडाणा - गुरु - रिमझिम	स्वच्छ ते ढगाळ	17-19	62-69	87-90
कोल्हापूर	22-23	31-32	कागल, करवीर, गगन-बावडा - गुरु, शुक्र - रिमझिम.	स्वच्छ ते ढगाळ	07-09	68-75	96-98
बेंगळूरु ग्रामीण	21-22	30-32	अनकल, दोड्डाबल्लापूर, बेंगळूरु-पूर्व, बेंगळूरु-उत्तर, बेंगळूरु-दक्षिण- गुरु- बुध - रिमझिम	स्वच्छ ते ढगाळ	11-13	36-47	78-84
बेळगावी	20-21	29-30	बेलागावी, गोकाक— गुरु- बुध- रिमझिम अथणी, चिकोडी-गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, बुध-रिमझिम	स्वच्छ ते ढगाळ	15-16	62-65	95-98
बिंदर	22-23	31-32	बसवकल्याण, मानवाबाद- गुरु,	स्वच्छ ते	13-17	51-54	78-85

			शुक्र, शनि, सोम, बुध-रिमझिम बिदर- गुरु- बुध- रिमझिम	ढगाळ			
बागलकोट	20-21	32-34	हुंगुंड, बागलकोट, जमखंडी, मुधोळ- गुरु, शुक्र, शनि, बुध- रिमझिम	स्वच्छ ते ढगाळ	23-27	36-44	73-77

टीप: वरीलहवामानमाहितीखालीलसंकेतस्थळांवरदिलेल्याहवामानअंदाजाचासारांशआहे

https://www.wunderground.com/?cm_ven=cgi

<https://imdagrimet.gov.in/weatherdata/BlockWindow.php>

<https://www.timeanddate.com/weather/india>

भाकृअनुप-राष्ट्रीयद्राक्षसंशोधनकेंद्रअचूकतेचादावाकरतनाही.

II. पाणी व्यवस्थापन

a. खरडछाटणी नंतरचे दिवस: 131

b. अपेक्षित पॅन बाष्पीभवन: 4 ते 5 मिमी

शिफारस केलेले सिंचन प्रमाण:

1. सर्व द्राक्ष उत्पादक प्रदेशांमध्ये रिमझिम ते मुसळधार पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. सिंचनाच्या पाण्याचा वापर वेलींच्या वाढीवर आधारित असावा. दिलेल्या दिवशी पाऊस 5 मिमी पेक्षा जास्त झाल्यास, त्या दिवसासाठी सिंचन पाणी वापरणे वगळले जाऊ शकते. साधारणपणे, जमिनीच्या वाफसा (क्षेत्राची क्षमता) स्थितीनुसार, सिंचन देऊ नये.
2. केन पकतेचा टप्पा: फक्त गरज भासल्यास पृष्ठभागावर ठिबकद्वारे 1500 -2000 लि/एकर प्रतिदिन पाणी द्यावे.
3. पावसाळ्यात, बांधावरील पालापाचोळा काढून टाकावा आणि पावसाचे पाणी जमिनीत मुरू द्यावे. यामुळे मुळ्यामध्ये जमा झालेले क्षार बाहेर पडतील. अशा प्रकारे काढलेला पालापाचोळा जमिनीत मिसळून जमिनीची सच्छिद्रता वाढवता येते.

पोषक व्यवस्थापन

1. चुनखडीयुक्त मातीत जेथे लोहाची तीव्र कमतरता दिसून येते, 3 दिवसांच्या अंतराने 2-3 ग्रॅम / ली फेरस सल्फेटची दोन ते तीन वेळा फवारणी करावी आणि त्यानंतर ठिबकद्वारे 15-20 किलो/एकर फेरस सल्फेटची फवारणी करावी. फर्टिगेशन डोस प्रत्येकी 5 किलोच्या किमान 3 डोसमध्ये विभागला पाहिजे. दर आठवड्याला ठिबकद्वारे 5 किलो/एकर विद्राव्य गंधक टाका. तसेच मॅग्नेशियम सल्फेट आणि पोटॅशियम सल्फेट 3 ग्रॅम / ली प्रत्येकी एकदाच फवारणी करा. सिंचनाच्या पाण्यात 100 ppm पेक्षा जास्त सोडियम असल्यास पाने काळे होण्याच्या लक्षणांवर बारकाईने लक्ष ठेवा.
2. पान कुरळे होण्याची शक्यता, पानांचे मार्जिन तपासा, थोडे ते अधिक पिवळे असल्यास, पोटॅशियमची कमतरता होण्याची शक्यता आहे. सल्फेट ऑफ पोटॅश 3-4 ग्रॅम / ली ची पर्णासंबंधी फवारणी आणि त्यानंतर 20-25 किलो सल्फेट ऑफ पोटॅश / एकर 2 ते 3 भागामध्ये फवारणी करावी.
3. जंबो, नानासाहेब जांभळा इत्यादी रंगीत जातींमध्ये पोटॅशियमची कमतरता असल्यास पानांचे कुरळेपणा आणि पानांच्या मार्जिनचे लालसर/कांस्थीकरण दिसून येते. सल्फेट ऑफ पोटॅश 3 ग्रॅम / ली ची पर्णासंबंधी फवारणी आणि त्यानंतर 20-25 किलो सल्फेट ऑफ पोटॅश / एकर 2 ते 3 भागामध्ये फवारणी करावी
4. पोटॅशियमचा वापर केन परिपक्वतेच्या अवस्थेपासून आवश्यक आहे. अंदाजे या अवस्थेत 32 किलो सल्फेट ऑफ पोटॅश (विद्राव्य दर्जाचे) द्यावे. पोटॅशियमचे लीचिंग नुकसान कमी करण्यासाठी किमान पाच डोसमध्ये विभाजन करा. या आठवड्यात 15 किलो सल्फेट ऑफ पोटॅश दोन-तीन स्प्लिटमध्ये लागू करा. चुनखडीयुक्त जमिनीत, या वाढीच्या अवस्थेत एकदा सल्फेट ऑफ पोटॅश (4 ग्रॅम / ली) पानांचा वापर करा.
5. मॅग्नेशियम सल्फेट 15 किलो/एकर दोन विभागांमध्ये वापरा. छाटणीनंतर 90-110 दिवसांच्या दरम्यान खताची मात्रा देण्यात यावी.
6. द्राक्ष बागांमध्ये केन ची परिपक्वता सुधारण्यासाठी सल्फेट ऑफ पोटॅश 4-5 ग्रॅम / ली आणि मॅग्नेशियम सल्फेटच्या दोन-तीन फवारण्या आवश्यक आहेत.
7. ढगाळ वातावरणामुळे प्रकाशाची तीव्रता कमी होते, केन परिपक्व होण्यासाठी प्रकाशाचा प्रवेश सुधारण्यासाठी छत व्यवस्थापन महत्वाचे आहे.

छाटणीपूर्व ऑपरेशन्स - फळ छाटणीचा हंगाम

1. सप्टेंबरमध्ये छाटणीचे नियोजन केले असल्यास, हिरवळीच्या खतासाठी सनहेंप किंवा धेंचा वाढवा आणि फुलांच्या आधी पुन्हा जमिनीत नांगरून टाका.
2. ऑगस्टमध्ये छाटणीचे नियोजन केले असल्यास, छाटणीपूर्वी खालील ऑपरेशन्स कराव्यात
 - अ) माती आणि सिंचनाच्या पाण्याची चाचणी केली पाहिजे आणि चाचणीच्या निकालांच्या आधारे पोषक तत्वांच्या वापराचे नियोजन केले पाहिजे.
 - ब) ज्या भागात पाऊस पडला नाही आणि सिंचनाच्या पाण्याची उपलब्धता कमी आहे, तेथे क्षार बाहेर टाकण्यासाठी रूटझोन (फक्त) पाण्याने भरून टाकावे आणि छाटणीपूर्वी मातीची संपूर्ण खोली ओलसर करावी आणि नंतर पालापाचोळा झाकून टाकावे. त्यानंतर पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पाणी द्यावे.
 - क) छाटणीच्या १५-२० दिवस आधी, जमिनीत कॅल्शियम कार्बोनेट किंवा सोडियम किती प्रमाणात आहे यावर अवलंबून, सल्फर/जिप्सम शेणखत/कंपोस्ट इत्यादींसह माती दुरुस्ती म्हणून वापरावे. ते जमिनीत मिसळावे आणि जमिनीवर सोडू नये.
 - ड) चुनखडीयुक्त मातीत, एसएसपी बेसल डोस म्हणून वापरल्यास, फॉस्फरस स्थिरीकरण टाळण्यासाठी शेणखत/कंपोस्ट इत्यादी मिसळा आणि नंतर जमिनीत लावा.

III. कॅनोपी व्यवस्थापन

द्राक्षबागेत या आठवड्यात केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना

1. हवामानात होत असलेल्या बदलामुळे आर्द्रता वाढत आहे. यामुळे वेलीची वाढ जोमात होते. अशा परिस्थितीत फुटीची विरळणी व शुट पिंचिंग करणे महत्वाचे असते.
2. नवीन फुटणाऱ्या फुटव्यांवर भुरी या करपा या रोगांचा प्रादुर्भाव दिसू शकतो. त्यामुळे अतिरिक्त असलेले फुटी काढून टाकाव्यात. व आवश्यक फुटी तारांवर व्यवस्थित बांधून घ्याव्यात. त्यामुळे आर्द्रता कमी होऊन वेलीमध्ये हवा खेळती राहील.
3. काडीची परिपक्वता होण्यासाठी पोटॅशचा वापर फवारणी किंवा ठिबंक सिंचनाद्वारे केल्यास फायद्याचे ठरते.

4. द्राक्षबागेत कलम करण्यासाठी महत्वाचा मानला जातो. त्यासाठी योग्य कलम काडीची निवड करणे सुद्धा खूप महत्वाचे असते.
 5. कलमकाडी निवडतांना रोगमुक्त व जास्त उत्पादन देणाऱ्या द्राक्ष जातींची निवड करावी.
 6. काडीची जाडी पेन्सिल साईज व कलम काडीचा पिथ पूर्णपणे गडद तपकिरी रोगाचा असावा.
 7. कलम करण्यासाठी निवडलेला खुंट हा अर्ध परिपक्व असावा.
 8. कलम यशस्वी होण्यासाठी ८० % आर्द्रता व ३०-३५°C तापमान आवश्यक असते. कलम करण्यापूर्वी ३ ते ४ दिवस अगोदर बागेत पाणी द्यावे.
 9. दमट वातावरणात जैविक फवारणी केल्यास रोगाच्या प्रादुर्भावावर नियंत्रण ठेवता येते.
 10. वातावरणात आर्द्रता वाढत असल्यामुळे व सतत फुटीची विरळणी केल्यामुळे (टायगर बड) वर फुटी फुटताना दिसून येतात. ही समस्या द्राक्षबागेत अधिक ठळक दिसून येते. अशा द्राक्षबागेत, एकतर पाणी टंचाई किंवा साइटोकिनिन आधारित पीजीआरचा जास्त वापर केला जातो. अचानक आर्द्रता वाढल्याने द्राक्षवाढीतील अंतर्गत गिबरेलिनची वाढ झाल्याने शाखीय वाढ होते. या अवस्थेत नियंत्रण करण्यासाठी नायट्रोजनयुक्त खत प्रामुख्याने युरिया किंवा अमोनियम सल्फेट २-३ दिवसांसाठी १.० किग्रॅ प्रति एकर दराने वापरावे. तसेच दोन आठवडे शूट पिंच करू नये तसेच शूट वर ४-५ पाने ठेवावीत.
 11. काही द्राक्षबागेत वलांड्याचा विकास होत आहे, त्यावरील शेवटची फूट वलांड्यावर व्यवस्थित बंधून घ्यावी व ४ ते ५ पानांवर शेंडा मारल्यास शेंड्याची वाढ नियंत्रणात राहील.
 12. जर हवामान अनुकूल नसेल अशा परिस्थितीत कळी व घड निघण्यासाठी PGR चा वापर आवश्यक ठरतो. म्हणून, शिफारस केलेल्या प्रमाणात 6 BA आणि Uracil चा उपयोग करावा.
- बगलफुटी निघू लागल्यानंतर P आणि K ग्रेड खताची किमान २ ते २.५ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात फवारणी करावी.

IV. रोग व्यवस्थापन

खरड छाटणीनंतरचे दिवस	रोगांचाधोका			
	केवडा	भुरी	बुरशीजन्यकरपा	इतर
131	नाही	मध्यम	मध्यम	जीवाणू करपा- मध्यम. तांबेरा-नाही

ऍन्थ्रॅकनोज अनेक ठिकाणी आढळून येते आणि कार्बेन्डाझिम/ थायोफेनेट मिथाइल @ १ ग्राम /लिटर वापरणे शक्य आहे. फवारणी ७ दिवसांनी पुनरावृत्ती केली जाऊ शकते. समस्या कायम राहिल्यास, ऍन्थ्रॅकनोज नियंत्रणासाठी हेक्साकोनाझोल @ ७५ मिली/लिटर दिले जाऊ शकते. याव्यतिरिक्त, ते पावडर बुरशी संसर्गावर नियंत्रण ठेवेल, जे आता बहुतेक भागात आहे. कासुगामायसिन + कॉपर ऑक्सीक्लोराईड @ ७५० ग्राम /हे वापरल्याने बॅक्टेरियाचे स्पॉट आणि अँथ्रॅकनोज नियंत्रित होईल. कोणत्याही जीवाणूजन्य आजारांसाठी स्ट्रेप्टोसायक्लिन लागू करू नये. तांब्याचा जास्त वापर टाळता येईल. डाउनी बुरशीच्या नियंत्रणासाठी बोर्डो मिश्रण @ ०. ५% लागू केले जाऊ शकते परंतु जर संसर्ग जड असेल तर बऱ्याच ठिकाणी सिस्टीमिक बुरशीनाशकांचा वापर केला जाऊ शकतो.

V. कीड आणि लाल कोळी व्यवस्थापन

- १ बहुतेक द्राक्ष विभागांमध्ये लाल कोळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे, त्यामुळे द्राक्षबागांचे काळजीपूर्वक निरीक्षण करा. लालकोळी प्रादुर्भाव आढळल्यास, सल्फर ८० डब्ल्यूडीजी @ १.५-२.० ग्रॅम प्रति लिटर किंवा अबॅमेक्टिन १.९% ईसी ०.७५ मिली/लि. पाणी याप्रमाणे फवारणी प्रभावी ठरते.

- २ खोडकिड, सेलोस्टर्ना स्कॅब्राटरचे प्रौढ द्राक्षबागांमध्ये आणि/किंवा द्राक्षबागांच्या लगतच्या घराजवळ रात्रीच्या वेळी विजेच्या दिव्याजवळ दिसू शकतात. ते दिवसा द्राक्षाच्या कोवळ्या देठाच्या सालावर खातांना सहज दिसतात. या काळात द्राक्षबागेत लक्षात आल्यावर ते सहजपणे हाताने पकडले जाऊ शकतात आणि मारले जाऊ शकतात. प्रौढांसाठी कोणत्याही कीटकनाशकाची फवारणी करणे आर्थिकदृष्ट्या प्रभावी नाही.
- ३ अळीचा प्रादुर्भाव असल्यास, फिप्रोनिल ८० डब्ल्यूजी @ ०.०६२५ ग्रॅम प्रति लिटर किंवा इमामेक्टिन बेंझोएट ५ एसजी @ ०.२२ ग्रॅम प्रति लिटर किंवा सायनट्रानिलिप्रोल 10 ओडी @ 0.7 मिली प्रति लिटर पाणी या फवारणी प्रभावी आहेत.
- ४ पिठ्या ढेकूण नियंत्रणासाठी बहुप्रभावी कीटकनाशकांचा वापर टाळावा. प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून खोड व ओलांडे, व्हर्टिसिलियम, मेटारायझियम, बिक्हेरिया यांसारख्या जैविक नियंत्रकांने धुवून काढले जाऊ शकतात.
- ५ फुलकिडे प्रादुर्भाव असल्यास, अतिरिक्त वाढ काढून टाका.
- ६ लाल रंगाची खोड कीड (डर्हिशीया कडंबी) द्राक्षांच्या क्षेत्रामध्ये सालीखाली अंडी घालण्यास व प्रादुर्भाव सुरुवात केली आहे. या खोडकिडीच्या पतंगांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी द्राक्षबागेजवळ प्रकाश सापळे लावावे. खोड आणि ओलांडावरील सैल साल काढून घ्यावी आणि प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून जुलै ते सप्टेंबर या महिन्यात किमान महिन्यातून एकदा मेटारायझियम @ ३-५ मिली प्रति लिटर पाण्यात या जैविक नियंत्रकांने खोड व ओलांडे धुवावे. जर प्रादुर्भाव आढळल्यास, सैल साल काढून खोड व ओलांडे मेटारायझियम @ ३-५ मिली प्रति लिटर पाणी आणि 1.5-2 लिटर पाणी प्रति झाड याप्रमाणे धुवून घ्यावेत.
- ७ नवीन द्राक्षबागांमध्ये ग्राफ्टिंगनंतर, उडद्या किडीचा प्रादुर्भाव दिसू शकतो. प्रादुर्भाव जास्त असल्यास, इमिडाक्लोप्रिड १७.८ एसएल @ १.५ मिली प्रतिवेल आळवणी करावी आणि फवारणीसाठी स्पिनेटोरम ११.७ एससी @ ०.३ मिली प्रति लिटर किंवा फिप्रोनिल ८० डब्ल्यूजी @ ०.०६२५ ग्रॅम प्रति लिटर पाणी याप्रमाणे फवारणी करावी.